

己酸羟孕酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_B7_B1_E9_85_B8_E7_BE_9F_E5_c22_313721.htm 药品名称己酸羟孕酮
英文名称Hydroxyprogesterone Caproate Injection 类别孕激素类
制剂本品为淡黄色或黄色的灭菌油状液体。注射液（1
）1ml:0.125g（2）2ml:0.25g（3）1ml:0.25g分子式成分化学名
为：17-羟基-孕甾-4-烯-3,20-二酮己酸酯。分子式

：C₂₇H₄₀O₄。分子量：428.62 药理毒理孕激素类药物，本品
是通过下丘脑-垂体的反馈机制抑制卵巢排卵，对少数仍有
排卵者的避孕作用，是由于药物改变宫颈粘液的理化性质和
对子宫内膜的影响，干扰了子宫内膜和受精卵发育的同步作
用，从而影响卵子的受精和受精卵的着床过程。药动学肌注
后在局部沉积储存，缓慢释放，发挥长效作用，维持时间1
~2周以上。大鼠肌注后体内半衰期为10天左右。适应症单用
时可用于治疗习惯性流产、月经有调、子宫内膜异位症、功
能性子宫出血等。不良反应少数病人在用药后有恶心、呕吐
、头昏、乏力、乳胀、疲乏等反应，一般均轻，不须处理。
使用过程中，如乳房有肿块出现，应即停止：如发现过敏反
应，不可再作注射。用法用量深部肌肉注射一次0.25~0.5g一
周1~2次 注重事项患急慢性肝炎、肾炎造成严重肝肾损害以
及有过敏史者禁用。1.有血栓病史、乳房肿块者一般不宜使
用。2.为防止过敏性休克，注射后应留观观察15~20分钟
；3.定期体检，包括乳腺、肝功能、血压和宫颈刮片的检查
，发现异常者应即停药；4.子宫肌瘤、高血压患者慎用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com