

甲羟孕酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_94_B2_E7_BE_9F_E5_AD_95_E9_c22_313723.htm 药品名称甲羟孕酮药物别名（甲孕酮，安宫黄体酮，DMPA，Provera）英文名称Medroxyprogesterone 类别孕激素类性状常用其醋酸酯，为白色或类白色结晶性粉末；无臭。在氯仿中极易溶解，在丙酮中溶解，在醋酸乙酯中略溶，在无水乙醇中微溶，在水中不溶。熔点202～208。制剂片剂：每片2mg；4mg；10mg。药理及应用常用其醋酸酯，为白色或类白色结晶性粉末；无臭。在氯仿中极易溶解，在丙酮中溶解，在醋酸乙酯中略溶，在无水乙醇中微溶，在水中不溶。熔点202～208。用法用量口服，一日2～40mg。（1）先兆流产口服1次4～8mg，一日2～3次。习惯性流产，开始3个月，每日服10mg，第4～4.5月每日20mg，最后减量停药。（2）痛经月经周期第6天开始，每日口服1次2～4mg，连服20天；或于月经第1日开始，1日3次，连服3天。（3）功能性闭经每日服4～8mg，连用5～10天。注重事项部分妇女有不规则出血等。如发生出血，可根据出血量加服快雌醇0.05～0.1mg，连服3日，即可止血。肝、肾功能不全者禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com