

环丙孕酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_8E_AF_E4_B8_99_E5_AD_95_E9_c22_313725.htm 药品名称环丙孕酮药物别名（色普龙，Androcur，Cyprostat）英文名

称Cyproterone〔 〕类别孕激素类性状结晶，熔点200～201

。制剂片剂：每片50mg。乳膏剂：1%。注射液：每支20mg。分子式成分药理及应用为17-羟孕酮类衍生物，具有很强的抗雄激素作用，也有孕激素活性。能抑制垂体促性腺激素的分泌，使体内睾酮水平降低。对男性尚能抑制精子生成，明显减少精子数及其活动度，降低精液生化组成及精子穿透宫颈粘液的能力，且都是可逆的。本品口服t_{1/24}小时，大部份以代谢物形式从尿和粪便排出。临床用于治疗男性性欲异常、妇女多毛症、痤疮、青春期早熟及前列腺癌等。对各种性变态（如同性恋、露阴癖、窥阴癖、恋童癖等）和异性恋者的性欲亢进具有抗性欲治疗效果。本品2mg与炔雌醇0.035mg组成复方Diane-35可作短效口服避孕药，对HDL的影响比D-甲炔诺酮小，且对女性痤疮也有明显疗效。用法用量口服：1次50mg，1日2次，必要时（如用于前列腺癌），可增至天天200mg或300mg（2次分服），直至生效，然后逐步降至维持剂量。对痤疮，可外用1%乳膏，每日2次，连用12周；也可口服Diane-35，于周期第一天起，每日1片，连续21天，停7天，一般使用3～4周期。对各种性变态，每日口服1次100～200mg，连续1～3周；或肌注，每周1次300～600mg。注重事项1）可有头痛、贫血、胃肠道反应、男子女性型乳房等。（2）与炔雌醇组成口服避孕药，可有恶心、头痛、性欲降低、抑郁、不规则子宫出血、乳房痛等。（3）能减少

精子生成，产生不正常精子，导致男性不育。（4）肝病、恶病质或消瘦者忌用。严重慢性抑郁、未发育青年人、有血栓史患者也忌用。（5）乙醇能降低本品作用，故对慢性酒精中毒者无效。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com