

甲磺酸双氢麦角汀 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_94_B2_E7_A3_BA_E9_85_B8_E5_c22_313745.htm

药品名称甲磺酸双氢麦角汀 药物别名海得琴，喜得镇，安得静，氢麦毒，海得金，海特琴，双氢麦角碱，二氢麦角碱、甲磺酸双氢麦角毒碱片 英文名称Dihydroergocristine Mesilate 类别脑血管脑代谢等 用药制剂喜德镇(Hydergine)，片剂：1mg。系三个麦角碱的双氢衍生物：甲磺酸双氢麦角汀、甲磺酸双氢麦角柯宁碱(Dihydroergocornine Mesilate)、甲磺酸双氢麦角分子式成分本品主含甲磺酸双氢麦角毒碱，该品系由等量的甲磺酸双氢麦角高碱、甲磺酸双氢麦角克碱和甲磺酸双氢麦角开碱[甲磺酸双氢- -麦角开碱：甲磺酸双氢- -麦角开碱(2：1)]所组成，其化学结构式如下：磺酸双氢麦角高碱

Dihydroergocornine-CH(CH₃)₂ 甲磺酸双氢麦角克碱

Dihydroergocristine-CH₂C₆H₅ 甲磺酸双氢- -麦角开碱

Dihydro- -ergocryptine-CH₂CH(CH₃)₂ 甲磺酸双氢- -麦角开碱 Dihydro- -ergocryptine-CH(CH₃)CH₂CH₃ 药理毒理

本品为3种麦角碱的双氢衍生物的等量混合物，有较强的受体阻断作用，还有中枢交感神经阻断作用，使血管扩张，降低血压，心率变慢，心肌兴奋性降低；抑制体温调节中枢而抑制因严寒引起的反射性血管收缩。药动学口服T_{max}0.5

~ 1.5h，生物利用度5%~12%，主要经胆汁和粪便排泄。T_{1/2} 13~15h。适应症脑动脉硬化症、脑震荡后遗症、脑中风后遗症及老年性痴呆等。不良反应恶心、胃部不适、面部潮红、鼻塞等。用法用量口服，3mg~6mg/日，3次/日，饭前服

用。一般3~4周后才显效，疗程为3个月。注重事项急慢性精神病、心动过缓患者禁用。低血压、心肌梗死、肾功能减退者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com