

氢麦角碱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E6_B0_A2_E9_BA_A6_E8_A7_92_E7_c22_313750.htm 药品名称氢麦角碱
药物别名喜德镇海特琴，甲磺酰双氢麦角毒 英文名

称Dihydroergotoxine 类别用于治疗老年性痴呆的药物药理及应用本品属 α -受体阻滞剂，直接作用于血管运动中枢，抑制血管紧张，使脑血管扩张；同时阻抑交感神经的兴奋和肾上腺过度分泌，去除血管痉挛因子，改善脑部血液循环，增加脑动脉供血，恢复大脑功能，使病理性脑电图得到改善。由于本品系由3种麦角生物碱的双氢化合物组成，相对地加强了对 α -受体的阻断作用，从而减少血管收缩，解除脑血管痉挛，促进血流通畅，使梗塞再通。临床上用于老年人脑循环障碍、老年性痴呆、脑动脉硬化症及中风后遗症等引起的头晕、头痛、注重力不集中、记忆力减退、抑郁、疲惫感等症状，但对患急慢性精神病者禁用。国内报道，使用益利循片（本品的台湾产品）治疗老年性痴呆66例（其中多发性梗塞性痴呆47例），开始时0.75mg口服，1日3次；3日后改为1.5mg，1日3次。疗程平均67日。结果，显效21例，有效33例，无效12例，总有效率81.8%，显著地优于对照组。60.3%的患者在7周内出现疗效。本品不良反应少，仅5例出现恶心、呕吐，改饭后即时服可避免；3例失眠，加服阿普唑仑即好转*。说明本品为甲磺酰（或乙磺酰）双氢麦角毒碱，每mg含甲磺酰双氢麦角柯宁碱（dihydroergocornine mesylate）、甲磺酰双氢麦角克碱（dihydroergocristine mesylate）及甲磺酰双氢麦角卡里碱（dihydroergocryptine mesylate）各三分之一。用法用量1日量2~6mg，分3次饭后即服。脑退化患者至少须连续服3

~ 5周后才显疗效。通常需要2~4个月的治疗。100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com