

康莱特注射液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BA\\_B7\\_E8\\_8E\\_B1\\_E7\\_89\\_B9\\_E6\\_c22\\_313752.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_BA_B7_E8_8E_B1_E7_89_B9_E6_c22_313752.htm) 药品名称康莱特注射液 英文名称ZCE-3静脉乳 类别抗肿瘤植物成分制剂静脉乳剂  
：10%100ml。适应症品对肺癌、肝癌、结肠癌及肺转移癌有很好的治疗作用。用法用量可单独使用，也可联合化疗、放疗、手术应用。静滴：100ml / 次，1次 / 日或隔日，20日为1疗程。动脉插管：50 ~ 100ml / 次，1次 / 周，3周为1疗程，不能与其他药混合、配伍使用。注重事项无明显的不良反应。严格控制滴速，100ml输入时间不少于1小时。如有过敏反应（如呼吸急促、寒战），可注射地塞米松。如出现高热，酌情停用。本品主要在肝脏内代谢，因此不适用病理性高脂血症、脂性肾病变或伴有高血脂的急性胰腺炎以及长期肝硬化患者。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)