

氯米芬 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B0\\_AF\\_E7\\_B1\\_B3\\_E8\\_8A\\_AC\\_c22\\_313760.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E6_B0_AF_E7_B1_B3_E8_8A_AC_c22_313760.htm) 药品名称氯米芬药物别名（氯酚胺，舒经芬，克罗米芬，Clomiphene，Clomid 英文名称Clomifene 类别促性腺激素性状常用其枸橼酸盐，为白色或类白色粉末；无臭。在乙醇中略溶，在水或氯仿中微溶，在乙醚中不溶。制剂片（胶囊）剂：每片（胶囊）50mg。分子式成分药理及应用具有较强的抗雌激素作用和较弱的雌激素活性。低剂量能促进垂体前叶分泌促性腺激素，从而诱发排卵；高剂量则明显抑制垂体促性腺激素的释放。对男性则有促进精子生成的作用，用于治疗少精症有效。常用制剂是由顺式异构体（约38%）和反式异构体（约62%）组成，其中顺式诱导排卵作用更强，达血浓度峰值时间较迟，消除较慢，给药后2小时，顺式和反式的血浆浓度为1：1，24小时后则为6：1。临床用于避孕药引起的闭经及月经紊乱。对无排卵型不育症、黄体功能不全、多囊卵巢等亦有一定疗效。对经前紧张症、溢乳症可改善症状。尚用于精子缺乏的男性不育症；对并有精索静脉曲张者，在静脉切除术后一年仍不生育，则可用本品治疗。用法用量口服：有月经者自经期第5天开始每日1次50mg，连服5天；无月经者任意1天开始，每日1次50mg，连服5天。一般在服药后7天左右排卵，3周后自然行经。连服3个周期为一疗程。闭经患者可先用黄体酮（肌注每日1次20mg）或人工周期（己烯雌酚每日1次1mg，连服20天，以后天天加黄体酮10mg肌注，每日1次）催经，在撤退性出血第5天开始服用本品。每日剂量不宜超过100mg。用于男性不育症，每日1次25mg，连服25天为一疗程。停药5天后，重

复服用，直至精子数达到正常标准，一般3~12个月疗效较好。注重事项（1）可见有面部潮红、恶心、头晕、乏力、腹胀、乳胀、皮疹、肝功能障碍等，停药可消失。（2）治疗男性不育症时，服药前必须进行精液检查、内分泌检查以及睾丸活检，以确定不育原因主要在于精子数量减少；用药期内要定期检查精液常规、FSH和睾酮水平；服药后一般经2~3个月始能生效。用药原则是低剂量、长疗程，要注重高剂量会抑制精子的发生。（3）对男性无精子患者，除睾丸活检证实尚有精子发生外，一律不得使用。（4）肝、肾功能不全患者，卵巢囊肿及其他妇科肿瘤患者禁用。服药后有严重过敏反应者应停用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)