

异长春花碱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_BC_82_E9_95_BF_E6_98_A5_E8_c22_313770.htm 药品名称异长春花碱

药物别名5-去甲去氢长春碱；诺维本 类别抗肿瘤植物成分制剂针剂：10mg / 1ml、50mg / 5ml。适应症非小细胞肺癌、转移性乳腺癌。用法用量静脉冲入：30mg / m²（低于20mg

/ m²时疗效下降或无效），1次 / 周。药物必须溶于125ml等渗盐水中，并于15~20分钟内静脉输入。输液后，沿此静脉再输入250ml等渗盐水冲洗。联合用药：(1)非小细胞肺癌

：NVB：30mg / （m²周），PDD（顺氯氨铂）：120mg / m²，第1、29日，每6周重复1次（采用大剂量PDD治疗时，必须给予水化）；或NVB：30mg / （m²mfk），PDD：80mg / m²，第1日，每3周重复1次，病情进展或毒性出现则停药。(2)转移性乳腺癌：NVB：25mg / m²，每1、8日，ADM（阿霉素）：50mg / m²，第1日，治疗持续时间一般为9周（以下超过阿霉素最大耐受量为宜）。注重事项可有粒细胞减少、贫血（常见）、深腱反射消失（神经毒性）、感觉异常，四肢无力、小肠麻痹（便秘）、麻痹性肠梗阻（罕见）、恶心、呕吐呼吸困难、支气管痉挛、脱发、下颌痛，静滴药液外漏可致组织坏死等。孕妇、乳妇和严重肝功能不全患者忌用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com