

炔酮肟 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_82_94_E9_85_AE_E8_82_9F_c22_313773.htm 药品名称炔酮肟 英文名称

norethisterone oxime 类别短效避孕药性状常用其醋酸酯，为白色结晶性粉末，熔点226~227℃。制剂片剂（探亲避孕药）：每片1mg；事后避孕药，每片2mg。分子式成分药理及应用为快诺酮类孕激素，并有雌激素、抗雌激素和抗孕激素活性。口服具有显著的抗着床作用，比炔诺酮大12.5倍，而毒性较小。能抑制子宫内膜的发育和分泌，加快受精卵的运行速度，使其与子宫内膜发育不同步，从而导致受精卵不能着床。临床用作探亲避孕药或事后避孕药，使用方便，停药后内膜能恢复正常，可复性好，比较安全。用法用量（1）用于探亲避孕，于探亲当天口服2片探亲避孕药（中午、晚上各1片），以后每晚服1片，探亲结束后需继续服2天。同居少于10天者，应连续服至10天。（2）用于事后避孕：夫妇同居一起者，每次房事后口服1片事后避孕药。注重事项服药后月经变化稍微，少数可有突破性出血、恶心、呕吐、食欲减退、皮疹、腰酸等，一般可自行消除。肝功能不良者慎用。100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com