

左炔诺孕酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_B7_A6_E7_82_94_E8_AF_BA_E5_c22_313797.htm 药品名称左炔诺孕酮
药物别名（左旋甲炔诺酮，d-甲炔诺酮，d-Norgestrel）英文名称Levonorgestrel 类别短效避孕药制剂复方左炔诺孕酮片：
每片含左炔诺孕酮0.15mg和炔雌醇0.03mg。左炔诺孕酮双相片 开始11天每片含左炔诺孕酮0.05mg和炔雌醇0.05mg；以后10天每片含相应药物0.125mg和0.05mg。左炔诺孕酮三相片 开始6天每片含左炔诺孕酮0.05mg和炔雌醇0.03mg；中期5天每片含相应药物0.075mg和0.04mg；后期10天每片含相应药物0.125mg和0.03mg
药理及应用为消旋炔诺孕酮的光学活性部分，其活性比炔诺孕酮强1倍，故使用剂量可减少一半，是目前应用较广泛的一种口服避孕药。口服吸收迅速，经0.5~2小时血浓度达峰值， $t_{1/2}$ 10~24小时。蛋白结合率93%~95%，生物利用度100%。较多分布在肝、肾、卵巢及子宫，代谢物主要以葡萄糖醛酸盐和硫酸盐形式从尿和粪便中排泄。与炔雌醇组成复合片或双相片、三相片可作为短效口服避孕药。复合片降低高密度脂蛋白较明显，双相片、三相片则影响较小；由于三相片每周期减少本品用量约40%，不良反应少。通过剂型改变，还可作为多种长效避孕药。用法用量用作短效口服避孕药：从月经第5天开始服用复方左炔诺孕酮片，天天1片，连服22天，不能间断，最好在晚饭后或临睡时服用。服完后等下次月经第5天继续服药。注重事项可有恶心、呕吐、头痛、乳胀、痤疮、体重增加、抑郁、降低HDL、突破性出血、闭经等。其他见甲炔诺酮。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com