

孕三烯酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E5\\_AD\\_95\\_E4\\_B8\\_89\\_E7\\_83\\_AF\\_E9\\_c22\\_313802.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_AD_95_E4_B8_89_E7_83_AF_E9_c22_313802.htm) 药品名称孕三烯酮药物别名（三烯高诺酮，18-甲三烯炔诺酮，R2323

，Methylnorgestrienone）英文名称Gestrinone〔 〕类别短效避孕药性状白色或淡黄色结晶性粉末，无臭，无味，熔点143~145。不溶于水，溶于乙醇、丙酮、二氧六环，易溶于氯仿、甲醇。制剂片剂，每片1.5mg；2.5mg。分子式成分药理及应用为中等强度孕激素，具有较强的抗孕激素和抗雌激素活性，亦有很弱的雌激素和雄激素作用。实验证实，本品具有显著抗着床、抗早孕作用，在月经周期早期服用尚有排卵抑制作用。其抗着床、抗早孕作用与改变宫颈粘液稠度、干扰子宫内膜发育、影响卵子运行速度及拮抗内膜孕酮受体等有关、临床用作探亲避孕药或事后避孕药。对早期妊娠，如与前列腺素并用，可提高引产成功率。用法用量（1）用作探亲避孕药：于探亲当天口服1次3mg，以后每次房事时服1.5mg。（2）用作事后避孕药：从月经第5~7天开始服药，每周2次（间隔3~4天），1次2.5mg。假如服药次数过少，失败率较高；假如每个周期服药8次以上，则较少失败。（3）用于抗早孕：天天口服9mg（2~3次分服），连服4天，停药后2天于阴道后穹窿处放置dl-15甲基PGF<sub>2</sub> 薄膜，每2.5小时1次，每次2mg，共4次，然后经2.5小时肌注1.5~2mgdl-15甲基PGF<sub>2</sub>，为一疗程。如无组织物排出，隔1天后重复疗程。注重事项少数人有头昏、乏力、胃部不适等。也可有月经周期缩短或延长、闭经、经量减少、不规则出血，但一般会自行减少。肝、肾功能不全患者忌用。100Test 下载频道开通，各类考

试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)