

奎孕酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_A5_8E_E5_AD_95_E9_85_AE_c22_313811.htm 药品名称奎孕酮药物别名（醋炔醚）英文名称Quingestanol〔 〕类别短效避孕药性状常用其醋酸酯，为白色或近白色针状结晶性粉末，无臭，无味，熔点175~185℃。不溶于水，易溶于氯仿，溶于二氧六环，略溶于丙酮，微溶于乙醇。制剂片剂：每片80mg甲醚抗孕膜（甲醇含膜，Me-Quingestanol）：每片含奎孕酮0.8mg和甲地孕酮0.5mg。甲醚抗孕丸：每丸合药同上。有效期1年。分子式成分药理及应用为作用较强的孕激素其活性比炔诺酮强2倍，并有弱雌激素活性。口服大剂量，其作用维持时间约两周。具有抗排卵作用和抗着床作用，主要能影响卵子运行速度和抑制子宫内膜的发育，使卵子运动与内膜发育不同步，从而阻碍孕卵着床。与甲地孕酮配伍组成甲醚抗孕膜，为一种新型的复合孕激素事后避孕药，口服有效，也可口含舌下，从口腔粘膜吸收。单用大剂量也可作为女用长效避孕药，妇女服药不受月经周期限制，任何一天服用均可产生避孕效果。用法用量（1）用作事后避孕药或探亲避孕药：一般避孕用，凡夫妻常住一起者，于月经第6~7天先口含1片甲醚抗孕膜或口服1丸甲醚抗孕丸，以后每次房事时即含1片（或服1丸），如隔3~4天无房事者，亦需口含1片（或服1丸）。探亲避孕，于探亲当天中午或傍晚先含1片（或服1丸），以后每次房事时即含1片（或服1丸）。（2）用作长效避孕药：于月经周期的任意一天，口服一次80mg，每两周1次。注重事项（1）主要有不规则出血、闭经，偶有恶心、头晕、头痛、乏力等。不规则出血发生在月经第12~16天者为最多，但血

量不多，一般3天左右干净；亦可加服炔雌醇0.0125mg，每日1~2次，连服3天，也能止血。（2）大剂量时可见胃肠道不适、头痛、抑郁、痤疮、水肿、乳胀等。（3）肝、肾病及高血压患者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com