

双炔失碳酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8F\\_8C\\_E7\\_82\\_94\\_E5\\_A4\\_B1\\_E7\\_c22\\_313814.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_8F_8C_E7_82_94_E5_A4_B1_E7_c22_313814.htm) 药品名称双炔失碳酯

药物别名（53号抗孕片，Anorethidrane Dipropionate）英文名称Anordrin 类别短效避孕药性状白色结晶性粉末，不溶于水

，溶于乙醇，易溶于乙醚、氯仿。制剂片剂（53号抗孕片）：肠溶糖衣片，每片含双炔失碳酯7.5mg、咖啡因20mg及维生素B630mg。药理及应用为具有抗着床作用的避孕药、并无孕激素活性，其雌激素活性为炔雌醇的1 / 36。小剂量与孕激素有协同作用，大剂量则有抗孕激素活性。能抑制子宫内膜腺体的发育，同时影响受精卵的运行速度，使其与内膜发育不同步，从而不利于着床。如在月经周期前期服药有排卵抑制作用。本品不受月经周期的限制，只需在房事后服用1片即可，适用于探亲或新婚夫妇使用，非凡是探亲两周以上多次房事的妇女。用法用量口服：每次房事后立即服53号抗孕片1片，但第一次房事后次日晨须加服1片；以后天天最多1片，每月不少于12片。假如探亲结束时还未服完12片，则需天天服1片，直至服满12片。注重事项（1）服药初期常见有恶心、呕吐、头晕、乏力、嗜睡等类早孕反应，必要时可对症处理，天天服用维生素B620mg或维生素C100mg。偶有阴道出血、白带增多、乳胀、乳头发深色、腹胀、食欲不振、口干等。

（2）少数人月经周期、经量有不同程度改变。对月经周期延长或闭经者，可加服甲孕酮25mg和炔雌醇0.015mg。（3）肝、肾病患者、人工流产未滿半年者、哺乳期或腹泻妇女忌用。（4）如必须在房事前服药者，可在事前1小时内服用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

