

盐酸青霉胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E9_9D_92_E9_c22_313816.htm 药品名称盐酸青霉胺
药物别名二甲基半胱氨酸 英文名称Penicillamine Hydrochloride
类别金属中毒解毒药制剂片剂：250mg。药动学口服吸收约57%，T_{max}约1h。主要贮存于皮肤和血浆，T_{1/2}为90h。本品在肝脏代谢，氧化为二硫化物由尿排出。适应症重金属中毒、肝豆状核变性（Wilson病）、胱氨酸尿及其结石，亦用于活动性类风湿关节炎。不良反应常见有厌食、恶心、呕吐、溃疡病活动、味觉异常、过敏反应等，也可见蛋白尿、肾病综合症。本品可影响创口愈合，偶可发生造血系统损害。相互作用本品可加重抗疟药、金制剂、免疫抑制剂、保泰松对造血系统和肾脏的损害。同时口服铁剂可减弱本品疗效。用法用量口服，成人：1g/日，4次/日。Wilson病和类风湿关节炎，开始125mg～250mg/日，以后每1～2月增加125mg～250mg，常用维持量为250mg/日，4次/日，最大量不超过1.5g/日。胱氨酸尿用量可参考尿胱氨酸排出量而定，最大量每日为2g。重金属中毒，0.5g～1.5g/日。小儿：常用量每日30mg/kg，2～3次/日。注重事项孕妇禁服。对青霉素过敏的患者，使用本品可能有变态反应。粒细胞缺乏症、再生障碍性贫血和肾功能不全禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com