

二巯丁二钠〔典〕〔基〕PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E4_BA_8C_E5_B7_AF_E4_B8_81_E4_c22_313826.htm 药品名称二巯丁二钠

〔典〕〔基〕英文名称Sodium Dimercaptosuccinate 类别金属中毒解毒药性状为带有硫臭的白色粉末，易吸水潮解。在水中易溶。水溶液无色或微红色，不稳定，常变为混浊或呈土黄色。制剂注射用二巯丁二酸钠：每支0.5g；1g。分子式成分药理及应用作用大致同二巯基丙醇，对酒石酸锑钾的解毒效力较之强10倍（但因能提高锑的排泄率，使血吸虫患者血液内的含锑量降低，以致使佛剂的疗效亦降低），且毒性较小。从血液中消失快，4小时排出80%。用于治疗锑、铅、汞、砷的中毒（治疗汞中毒的效果不如二巯而磺钠）及预防镉、钴、镍中毒，对肝豆状核变性病有驱铜及减轻症状的效果。用法用量（1）肌肉注射：0.5g / 次，1日2次，防止疼痛可加2%普鲁卡因2ml（先作皮试）。（2）缓慢静脉注射（不宜静滴）：用于急性中毒（如锑剂引起的心律紊乱），首次2g，以注射用水10~20ml稀释后注射，以后每次1g，每小时1次，共4~5次。用于亚急性中毒，每次1g，每日2~3次，共用3~5日。用于慢性中毒，每次1g，每日1次，1疗程5~7日，可间断用2~3疗程。注重事项（1）可有口臭、头痛、恶心、乏力、四肢酸痛等反应，注射速度越快反应越重，但可于数小时内自行消失。（2）粉剂溶解后立即使用，水溶液不稳定，不可久置，也不可加热。正常者为无色或微红色，如呈土黄色或混浊，则不可用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com