

依托泊甙软胶囊 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BE\\_9D\\_E6\\_89\\_98\\_E6\\_B3\\_8A\\_E7\\_c22\\_313847.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E4_BE_9D_E6_89_98_E6_B3_8A_E7_c22_313847.htm)

药品名称依托泊甙软胶囊 药物别名泊瑞 英文名称Etoposide Soft Capsules 类别抗肿瘤植物成分制剂 本品为软胶囊，内容物为无色或淡黄色澄明粘稠液体。分子式成分化学名：4'-去甲基表鬼臼毒素-D-乙叉吡喃葡萄糖甙。分子式：C<sub>29</sub>H<sub>32</sub>O<sub>13</sub>。分子量：588.57。药理毒理本品为细胞周期特异性抗肿瘤药物，作用于DNA拓扑异构酶II，形成药物-酶-DNA稳定的可逆性复合物，阻碍DNA修复。实验发现这复合物可随药物的清除而逆转，使损伤的DNA得到修复，降低了细胞毒作用。因此，延长药物的给药时间，可能提高抗肿瘤活性。药动学本品口服吸收后，在0.5~4小时达到血药浓度峰值，生物利用度为50%，主要分布于胆汁，腹水，尿液，胸水和肺组织中，很少进入脑脊液。主要以原形和代谢产物从尿中排泄。适应症小细胞肺癌，恶性淋巴瘤，恶性生殖细胞瘤，白血病，对神经母细胞瘤，横纹肌肉瘤，卵巢癌，非小细胞肺癌，胃癌和食管癌等有一定疗效。不良反应主要为血液学和消化道毒性，与静脉制剂比较，呕吐发生率较低。极少数可发生严重过敏反应，应重视。相互作用尚不明确。用法用量单用每日60~100mg/m<sup>2</sup>，连用10日，每3~4周重复。联合化疗50mg/m<sup>2</sup>/天，连用3或5天。注意事项对本品过敏者，孕妇及哺乳妇女禁用。宜饭前服用，注重可能发生的过敏反应。本品有骨髓抑制作用，用药期间应定期检查病人的血象。肝功能障碍者慎用。

#093.禁用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)