

复方己酸羟孕酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_8D\\_E6\\_96\\_B9\\_E5\\_B7\\_B1\\_E9\\_c22\\_313852.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_A4_8D_E6_96_B9_E5_B7_B1_E9_c22_313852.htm) 药品名称复方己酸羟孕酮 英文名称Hydroxyprogesterone Caproate#093. 类别长效避孕药制剂复方己酸羟孕酮注射液：每支1ml，含己酸羟孕酮250mg和戊酸雌二醇5mg。 本品为淡黄色或黄色的澄明油状液体。分子式成分含己酸羟孕酮(C<sub>27</sub>H<sub>40</sub>O<sub>4</sub>)和戊酸雌二醇 药理毒理本品为雌激素孕激素配伍的长效避孕药。肌肉注射后局部沉积储存，缓慢释放，发挥长效作用，维持时间1-2周以上。己酸羟孕酮与戊酸雌二醇配伍，具有抑制排卵作用。对少数仍有排卵者的避孕作用，是由于药物改变宫颈粘液的理化性质和对子宫内膜的影响，干扰了子宫内膜和受精卵发育的同步作用，从而影响卵子的受精和受精卵的着床过程。药动学妇女肌肉注射复方己酸羟孕酮后，血中雌二醇水平迅速上升，4-5天后可达峰值，己酸孕酮在体内的半衰期约为10天左右，在注射局部可潴留40天左右。适应症与雌激素类配伍，用于长效避孕不良反应长效避孕注射剂的类早孕反应比口服药轻，其他有不规则阴道出血、乳房胀痛、心悸、腹痛、高血压等，甚至可发生过敏性休克。使用过程中，如乳房有肿块出现，应即停止；个别可有过敏反应，不可再注射。用法用量深部肌注，肌肉注射，第一次于月经周期的第5日注射2ml，以后于每个月经周期的第10~12日注射1ml。（若月经周期短，宜在月经来潮第10天注射，即药物必须在排卵前2-3天内注射，以提高避孕效果）。必须按月注射，注射液若有固体析出，可在热水中温热溶化后摇匀再用。 注重事项

注射后应留看观察15~20min。发生不规则阴道出血时，可于注射后10日，每日服短效口服避孕药1片~2片，连续5日以延长周期，减少经量或缩短周期。肝、肾功能不全及乳房肿块患者禁用。

- 1.需按时注射，以免影响避孕效果和引起月经的改变；
- 2.为防止过敏性休克，注射后应留看观察15-20分钟；
- 3.定期体检，包括乳腺、肝功能、血压和宫颈刮片的检查，发现异常者应即停药；
- 4.子宫肌瘤、高血压患者慎用。
- 5.注射后，一般维持14天左右月经来潮，如注射后闭经，可隔28天再注射一次。如闭经达2月，应停止注射，等待月经来潮，闭经期间要采用其他方法避孕，待月经来后再按第一次方法，重新开始注射。
- 6.注射后，有人可出现月经改变，如经期延长，周期缩短，经量增多及不规则出血等，其发生率在用药半年后明显下降。当发生此种副作用时，可及时按以下方法处理：
  - (1) 经期延长：以出血较多日期时，可口服复方炔诺酮片或复方甲地孕酮片，每日1-2片，连服4日，即可止血，在下次经前7天依同法连服4天，可预防出血，如此应用3个月后即停用，如再出血，可依上法再用。
  - (2) 月经后出血：天天服炔诺酮0.0125-0.025mg，直到下次注射日期为止。但若已接近下次注射日期者，可不必处理。
  - (3) 月经周期缩短：注射后10天开始加服复方炔诺酮片或复方甲地孕酮片，每日1-2片，连服4-6天。
  - (4) 注射后长期出血不止，可口服复方炔诺酮片或复方甲地孕酮片4天，出血停止后一周，注射本品一支，于注射第11天，口服复方炔诺酮片或复方甲地孕酮片，每日1-2片，连服4天，可预防出血。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)