

碘附 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_A2_98_E9_99_84_c22_313858.htm 药品名称碘附 英文名称Iodophor 类别外科用药及消毒防腐收敛药 药理及应用系由表面活性剂与碘络合而成的不稳定络合物，其中有80%~90%的结合碘可解聚成游离碘，浓度大，杀菌力强，无味、无刺激，无致敏性，毒性低。为广谱杀菌剂，能杀死病毒、细菌、芽孢、真菌、原虫。在15ppm的浓度下1分钟内能杀死各种细菌的繁殖体，杀死结核杆菌需要较长时间，杀死真菌需1.5小时，对芽孢则需更长时间；在150ppm的浓度下10分钟即能破坏乙肝表面抗原（HBsAg）。本品除用于皮肤消毒以外，还可用于金属医疗器械、食具等的消毒。在消毒用浓度下通常为红色或琥珀色，可以直接用于手术病人切口部位的皮肤和粘膜，也可供妇产科、泌尿科体外冲洗之用。当其浓度下降为10ppm以下时，变为白色或淡黄色，失去杀菌活性。常用于：手术部位的皮肤消毒；治疗烫伤；治疗滴虫性阴道炎；治疗化脓性皮肤炎症及皮肤真菌感染；餐具和食具的消毒。贮存遮光、密闭、阴暗处保存。用法用量冲洗用0.1%溶液；治疗炎症或溃疡用5%~10%软膏或栓剂；餐食具消毒用0.05%溶液浸泡5分钟。注重事项（1）对碘过敏者慎用。（2）烧伤面积大于20%者不宜用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com