

硫代硫酸钠〔典〕〔基〕PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A1\\_AB\\_E4\\_BB\\_A3\\_E7\\_A1\\_AB\\_E9\\_c22\\_313862.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_A1_AB_E4_BB_A3_E7_A1_AB_E9_c22_313862.htm) 药品名称硫代硫酸

钠〔典〕〔基〕药物别名次亚硫酸钠；大苏打，海波

，Sodium Hyposulfide，Hypo 英文名称sodium Thiosulfate 类别  
氰化物中毒解毒药制剂注射液：每支0.5g（10ml）；1g（20ml）。  
注射用硫代硫酸钠：每支0.32g无水物（相当于含结晶水0.5g）；0.64g无水物。药理及应用为氰化物的解毒剂，在酶的参与下能和体内游离的（或与高铁血红蛋白结合的）氰离子相结合，使变为无毒的硫氰酸盐排出体外而解毒。此外尚有抗过敏作用。临床上用于皮肤瘙痒症、慢性荨麻疹、药疹和氰化物及砷剂等的中毒。用法用量（1）抗过敏：每次静注5%10～20ml，每日1次，10～14日为1疗程。（2）抢救氰化物中毒：由于本品解毒作用较慢，须先用作用迅速的亚硝酸钠、亚硝酸戊酯或亚甲蓝，然后缓慢静注12.5～25g（25%～50%溶液50ml）。口眼中毒者，还须用5%溶液洗胃，洗后留本品溶液适量于胃内。注重事项（1）有头晕、乏力、恶心、呕吐等反应。（2）静脉注射不宜过快，以免引起血压下降。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)