

密钙息 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_AF_86_E9_92_99_E6_81_AF_c22_313870.htm 药品名称密钙息 药物别名降钙素、密盖息 英文名称Calcitonin 类别甲壮腺激素类药物 药动学肌肉或皮下注射后，Tmax约0.5~1h，T1/2约70~90min，95%的代谢物随尿排出，蛋白结合率为30%~40%。鼻腔喷雾应用的生物利用度约为注射的50%。适应症骨质疏松伴有骨痛或绝经后骨质疏松、高钙血症、恶性肿瘤性骨质溶解、变形性骨炎等。不良反应可见恶心、呕吐、面部潮红、发热等及耳鸣、眩晕、哮喘和便意等，大剂量作短期治疗时易引起继发性甲状腺功能低下，可增加垂体肿瘤发生率。用法用量急性高钙血症，每日按体重5u~10u/kg，加入生理盐水500ml内缓慢滴注，6h滴完，或将上述剂量分2~4次缓慢静脉推注；亦可用鼻喷剂200u~400u/日，分数次给药。慢性高钙血症，每日按体重5u~10u/kg，皮下或肌肉分1~2次注射；亦可用鼻喷剂200u~400u/日，分数次给药。骨痛伴骨质疏松，每日或隔日皮下或肌肉注射50u~100u。骨痛伴骨质溶解，100u~200u/日，静脉滴注或肌肉、皮下分1~2次注射。变形性骨炎，每日或隔日皮下或肌肉注射50u~100u，疗程至少3个月；亦可用鼻喷剂200u/日，分2~4次给药。绝经后骨质疏松，100u/日，皮下或肌肉注射；亦可用鼻喷剂100u~200u/日或隔日200u。注重事项长期治疗者每月检查尿沉渣1次。有过敏史者用药前可先用1:100降钙素稀释做皮试。妊娠C类，对本品过敏者、孕妇、哺乳期妇女禁用 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com