

雌二醇氮芥 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E9_9B_8C_E4_BA_8C_E9_86_87_E6_c22_313872.htm 药品名称雌二醇氮芥
药物别名癌腺治，依立适 Estracyt 英文名称Estramustine 类别
抗肿瘤激素类制剂胶囊：每粒150mg。粉针剂：每支150mg
；300mg。 药理毒理雌二醇氮芥是依据受体学说设计的药物
，是以雌二醇磷酸酯为载体的氮芥类化合物，具有烷化剂和
雌二醇的双重作用。根据受体学说、不同的专一性，甾体类
激素对不同的靶器官具有不同的专一性。甾体类激素与烷化
剂的结合物有可能选择性地进入激素依靠性的瘤组织中，从
而减轻了烷化剂对全身的作用。这不仅发挥了甾体类激素的
作用，而且也加强了烷化剂的抗癌效应，同时相应降低了烷
化剂的毒副作用。适应症前列腺癌、乳腺癌、胰腺癌，对其
它晚期恶性肿瘤也有疗效。 不良反应（1）轻度胃肠道反应
，如恶心、呕吐等；（2）静脉给药可有暂时性骨髓抑制及血
栓性静脉炎；（3）偶有肝功能异常；（4）罕见有乳腺肿胀
、男性女性化。相互作用奶类制品会影响雌二醇氮芥的吸收
。用法用量静注：每日300～500mg溶于溶剂中静注，连用3周
，然后改为每周2次；或改为口服；每日600～900mg，分2次
。静脉或口服一般3～4周为1疗程，无效停用。 注重事项附带
的粉针溶剂需小心缓慢地加入雌二醇氮芥的安瓶中，并避免
震动，以防止起泡沫。等渗盐水不能作为溶剂使用。 100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com