

氟他胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B0\\_9F\\_E4\\_BB\\_96\\_E8\\_83\\_BA\\_c22\\_313878.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E6_B0_9F_E4_BB_96_E8_83_BA_c22_313878.htm) 药品名称氟他胺药物别名缓退瘤、福至尔、氟硝丁酰胺 Fugerel 英文名称Flutamide 类别抗肿瘤激素类制剂片剂：0.25g。胶囊0.125g。分子式成分化学名称为：2-甲基-N-[4-硝基-3-(三氟甲基)苯基]丙酰胺。分子式：C<sub>11</sub>H<sub>11</sub>F<sub>3</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>。分子量：276.22。药理毒理本品为非类固醇的雄激素拮抗剂，与雄激素竞争肿瘤部位的雄激素受体，能阻止雄性激素在靶细胞的吸入及/或阻止雄性激素与细胞核的结合，显示强力的抗雄性激素作用。药动学口服吸收迅速而完全，大部分在首次通过肝脏时转变为活性代谢物。血浆T<sub>1/2</sub>约5h~6h。适应症前列腺癌或良性前列腺肥大。不良反应主要有男子乳房女性化和胃肠道不适，其他有失眠、疲惫、肝功异常、性功能减退、瘙痒、带状疱疹等。相互作用与亮脯利特(Leuprolide)合用治疗转移性前列腺癌，可明显增加疗效。因本药会增加血浆中睾丸酮及雌二醇的浓度，可能会发生水潴留现象。用法用量口服，成人0.25g/次，3次/日，饭后服。用药过量:如病人清醒，应催吐，并给予全身性支持处理。注重事项对本药有过敏反应者禁用。需长期服用本品时应定期检查肝功能和精子计数，如发生异常应减量或停药，一般可恢复正常。本品可增加睾丸酮和雌二醇的血浆浓度，可能发生体液潴留。本品可单独应用，也可与LHRH激动剂、化疗药物联合应用。对良性前列腺增生也有一定的疗效。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)