

足叶乙甙 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_E8\\_B6\\_B3\\_E5\\_8F\\_B6\\_E4\\_B9\\_99\\_E7\\_c22\\_313885.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022_E8_B6_B3_E5_8F_B6_E4_B9_99_E7_c22_313885.htm) 药品名称足叶乙甙药物别名拉司太特 类别抗肿瘤植物成分制剂胶囊分子式成分拉司太特胶囊25含有足叶乙甙25mg和添加物，聚乙二醇，对羟基甲酸乙酯及对羟基苯甲酸丙酯。适应症小细胞肺癌和恶性淋巴瘤 不良反应血液 白细胞减少，血小板减少，出血和贫血。肝脏 有时出现COP.GPT.AL-P胆红素上升等肝功异常。肾脏 有时出现BUN上升，肌酸内酰胺上升。消化系统 有时出现恶心、呕吐，食欲不振，口腔炎，腹痛，腹泻，便秘等症状。过敏症 有时出现红疹等。皮肤 有时出现严重的脱毛，红斑和搔痒等。神经系统 有时出现四肢麻木，头痛等症状。循环系统 可出现心电图改变，不整脉，低血压的症状。呼吸系统 可出现间质性肺炎。其他 有时出现倦怠感，发烧等。相互作用与其它抗肿瘤药物或放疗照射合用有时会增强骨髓机能抑制等副作用。有报告足叶乙甙与其它抗肿瘤药物联合使用时，会出现急性白血病（部分伴有白血病前期表现）用法用量一般成人一个疗程足叶乙甙50～100mg连续口服14天-21天，停药一周。必要时反复使用。药量可根据病情和症状的严重性适当增减。注意事项因为有引起骨髓机能抑制等严重副作用，所以应经常进行临床检查（血液检查，肝功能、肾功能的检查等）。如有任何异常，应适当的减少药量或停药。又因长期使用副作用大，有时呈迁延性改变，所以给药时应当慎重。要充分注重感染和出血倾向的出现或加重。小儿给药时要非凡注重副作用的出现，应当慎重用药。必须要对小儿及生殖年龄的患者给药时，应考虑到对性腺的影响。有严重

骨髓机能抑制的病人、对本制剂有严重过敏史的患者禁用。有骨髓机能抑制的病人、肝功能障碍的患者、有肾功能障碍的患者、合并感染的患者、水痘患者（可能出现致命的全身症状）慎用。老年人给药：因为老年人出现生理性功能减退（造血功能异常，肝功能异常，肾功能异常等），所以给药期间和间歇期间均应给予注重。妊娠妇女和哺乳期妇女的给药：动物实验报告有致畸作用。所以妊娠妇女及有妊娠可能的妇女最好不要给药。动物实验报告表明，药物向乳汁中移行，所以哺乳期妇女给药时，应当中止哺乳。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)