

羟孕酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_BE_9F_E5_AD_95_E9_85_AE_c22_313896.htm 药品名称羟孕酮药物别名

(羟孕酮己酸酯，长效黄体酮，Delalutin) 英文名

称Hydroxyprogesterone 类别长效避孕药性状常用其己酸酯，

为白色或几乎白色的结晶性粉末；无臭，无味。在乙醇、丙酮或乙醚中易溶，在茶油或蓖麻油中略溶，在水中不溶。熔点

120~124℃。制剂注射液：0.125g(1ml)；0.25g(2ml)；

0.25g(1ml)。复方己酸羟孕酮注射液(避孕针一号)：

每支1ml，含己酸羟孕酮250mg和戊酸雌二醇5mg分子式成分

药理及应用本品为长效孕激素，其孕激素活性为黄体酮的7倍，并无雌激素活性。肌注后在局部沉积储存，缓慢释放，发挥

长效作用，维持时间1~2周以上。本品与戊酸雌二醇配伍

作长效注射避孕药，具有排卵抑制作用，每月肌注1次，避孕

效果肯定。本品单用时可用于治疗习惯性流产、月经不调、

子宫内膜异位症、功能性子宫出血等。用法用量复方己酸羟

孕酮注射液(避孕针1号)：深部肌注，第一次于月经来潮

第5天注射2支，以后每月1次，于月经来潮后10~12天注射1

支(若月经周期短，宜在月经来潮的第10天注射，即药物必须

在排卵前2~3天内注射，以提高避孕效果)。必须按月注射。

注射液若有固体析出，可在热水中温热溶化后摇匀再用。

注射后，有人可出现月经改变(如经期延长、周期缩短、

经量增多及不规则出血等，其发生率在用药半年以后即明显

下降)。当发生此种副作用时，可及时按以下方法处理：

经期延长：已出血较多日期时，可口服复方炔诺酮片(避孕

片一号)或复方甲地孕酮片(避孕片二号)，每日1~2片，

连服4日，即可止血。在下次经前7天依同法连服4天，可预防出血，如此应用3个月后停用。如再出血，可依上法再用。

月经后出血：天天服炔雌醇0.0125～0.025mg，直至下次注射日期为止。但若已接近下次注射日期者，可不必处理。

月经周期缩短：注射后10天开始加服复方炔诺酮片或复方甲地孕酮片，每日1～2片，连用4～6天。

注射后长期出血不止：可口服避孕片一号或二号4天。出血停止后一周，注射本品1支，于注射第11天，口服复方炔诺酮片或复方甲地孕酮片，每日1～2片，连服4天，可预防出血。

注重事项1) 为保证避孕成功，并减少月经改变的副作用，要按时注射，并须将药液抽净，作深部肌注。(2) 注射后，一般维持14天左右后月经来潮。如注射后闭经，可隔28天再注射1次。如闭经达2月。应停止注射，等待月经来潮。闭经期间要采用其他方法避孕，待月经来后再按第一次办法，重新开始注射。(3) 少数病人在用药后有恶心、呕吐、头昏、乏力、乳胀、疲乏等反应，一般均轻，不需处理。(4) 使用过程中，如乳房有肿块出现，应即停止；如发现过敏反应，不可再作注射。(5) 患急慢性肝炎、肾炎及乳房肿块者忌用。子宫肌瘤、高血压患者慎用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com