

福美司坦 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_A6_8F_E7_BE_8E_E5_8F_B8_E5_c22_313902.htm 药品名称福美司坦药物别名兰特隆，LENTARON 英文名称Formestane 类别抗肿瘤激素类药理及应用本品为雄烯二酮的衍生物。在生理情况下，它可竞争性地抑制合成酶而使组织中的雌激素的生物合成减少，继而发挥其抗癌作用。1次注射250mg，30~48小时后，其血浆浓度为10~18ng/ml。其后2~4日内血浓度迅速下降， $t_{1/2}$ 约5~6日。本品用于自然或人工绝经后的乳腺癌。常用其注射剂，每瓶250mg。以生理盐水稀释后作深部肌肉注射，每2周注射一次。不良反应不良反应常见者有皮肤红、痒、痛、烧灼感；偶有下肢水肿、潮热、恶心、呕吐、肌紧张及喉痛等。绝经前、孕期及授乳期妇女禁用。注重事项（1）绝大多数病人可以耐受（其中58.6%患者无副作用），少数病例需减量或暂时停药或中断治疗。副作用为恶心、呕吐、腹泻，月经失调、停经、阴道出血，颜面潮红、脱发、皮疹，头痛、眩晕，体重增加，浮肿，骨痛，肿瘤处疼痛，长期大量使用可出现视力障碍。偶有白细胞和血小板减少。（2）对胎儿有影响，妊娠妇女不宜用。（3）血象和肝功能异常者应慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com