

盐酸萘替芬软膏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E8_90_98_E6_c22_313903.htm 药品名称盐酸萘替芬软膏

药物别名得肤康 Derphyclear 英文名称naftifine hydrochloride ointment 类别皮肤科用药制剂软膏剂：0.1 g/10 g 分子式成分

】(E)-N-甲基-N-(3-苯基-2-丙烯基)-1-萘甲胺盐酸盐药理毒理

本品为外用抗浅表真菌病药物。对敏感皮肤真菌如毛癣菌、小孢子菌和表皮癣菌等具有杀菌作用，对念珠菌和酵母菌具有抑菌作用。其作用机制可能是通过抑制角鲨烯单胺氧化酶，干扰真菌固醇的生物合成，导致细胞内固醇数量减少以及角鲨烯(酶底物)的堆积，使真菌的脂质代谢发生紊乱而起作用的。

动物实验对以下3个系统无影响： 神经系统 200 mg/kg，ig，7 d后对小鼠自主活动无明显影响。 心血管系统 10 mg/kg，ig，4 h内对猫血压、心率、心电图无明显影响。

呼吸系统 10 mg/kg，ig，4 h内对猫的呼吸频率和深度无明显改变。 药动学人体皮肤局部吸收2%~6%。口服吸收后主要经淋巴和门脉转运，肝中分布最高，其次是肾和脾，在肝中大量降解，确定化学结构的代谢产物15种，其中9种在人尿中发现，代谢产物失去抗真菌活性，经肾和胆汁排泄。

适应症毛癣菌属、小孢子菌属及表皮癣菌等真菌感染的体癣、股癣、手足癣、花斑癣、甲癣及浅表念珠菌病。不良反应不良反

应发生率2.6%(8/310)，主要表现为用药局部不同程度的瘙痒或疼痛，个别局部潮红伴灼热或红斑糜烂。用法用量涂于真菌感染患部及患部四周2.5cm的正常皮肤上，bid。注重事项

对萘替芬或特比萘芬过敏者禁用。 孕妇、哺乳期妇女慎

用。 本品仅供皮肤涂敷用，不能用于眼内，要避免与鼻、口腔及其他粘膜接触。 开放性伤口不宜使用本品。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com