

庚炔诺酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_BA_9A_E7_82_94_E8_AF_BA_E9_c22_313906.htm 药品名称庚炔诺酮药

物别名（炔诺酮庚酸酯，Norigest，Noristerat）英文名

称Norethisterone Enanthate 类别长效避孕药性状白色或微黄色

结晶性粉末，熔点78～81℃。不溶于水，易溶于丙酮、氯仿

、甲醇、苯。制剂注射液：每支200mg（1ml）。复方庚炔诺

酮注射液（复庚一号）：每支1ml，含庚炔诺酮50mg和戊酸雌

二醇5mg。分子式成分药理及应用为长效孕激素，肌注后贮

存在肌肉组织中逐步缓慢释放而发挥长效避孕作用。其主要

作用为抑制排卵，尚能影响宫颈粘液稠度和抑制子宫内膜生

长发育。注射后经5～7天血浓度达峰值， $t_{1/2}$ 27.5～22.5天。单

用肌注一次200mg，作用可维持2～3个月，可作为二个月一针

的长效避孕药。本品与戊酸雌二醇配伍组成复方庚炔诺酮注

射液，每月注射一次作用可维持30天，对月经周期的控制效

果明显优于单用庚炔诺酮针用法用量（1）庚炔诺酮注射液

于月经第5天肌注1支，以后每2个月注射1次，每针可避孕2个

月经周期。（2）复方庚炔诺酮注射液 第一次于月经第5天肌

注2支，第二周期起，每次于月经第10天肌注1支，每支可避

孕1个月经周期。注重事项（1）单用时主要有不规则出血、

经期延长和闭经等。（2）复方庚炔诺酮注射液用后可有恶

心、呕吐、食欲不振、乳房胀痛、头晕、乏力、嗜睡等，但

随用药次数增加而减少或消失。100Test 下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com