

异维甲酸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_BC_82_E7_BB_B4_E7_94_B2_E9_c22_313908.htm 药品名称异维甲酸药物别名泰尔丝、异维A酸、异曲替酯、保肤灵、顺式维甲酸 Roaccutan、RO43780 英文名称isotretinoin 类别皮肤科用药 制剂10MG/粒 分子式成分本药的化学名为3,7-二甲基-9-{2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-基}2顺-4反-6反-8反-壬四烯酸。分子式为C₂₀H₂₈O₂，分子量为300.44。本品为深褐色胶丸，内含橙黄色油状混悬液。药理毒理治痤疮药。本品经药理试验表明具有缩小皮脂腺组织、抑制皮脂腺活性、减少皮脂分泌以及减轻上皮细胞角化和减少痤疮丙酸杆菌数的作用。药动学本药口服后迅速由肠道吸收，2-4 hr后血浓度高峰，半衰期为10-20 hr，在肝脏或肠壁代谢，以原形及代谢产物由肾脏和胆汁排出。适应症重型痤疮，尤其适用于结节囊肿型痤疮，亦可用于毛发红糠疹。不良反应常见唇干、唇炎、口干、皮肤干燥和脱屑。偶见瘙痒、鼻衄、恶心。相互作用避免与维生素A及四环素同时服用。用法用量口服一次10 mg，一日2-3次，一个月后改为一次10 mg，一日1-2次。饭后服用，疗程一般为3个月。注重事项妊娠X类.孕妇、哺乳期妇女、肝、肾功能不全、维生素A过量及高血脂症患者禁用。育龄妇女服药前、停药后应作妊娠试验。育龄妇女在用药前1~2个月，用药期间及停药后至少1个月必须采取绝对可靠的避孕措施，医生应以口头或文字的方式告知病人用药中妊娠的危害性和避孕失败包含的风险。接受此药的患者在治疗期间及在停药后30天内不得为他人供血，以防用于孕妇。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com