

次甲氯地孕酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E6_AC_A1_E7_94_B2_E6_B0_AF_E5_c22_313909.htm 药品名称次甲氯地孕酮 英文名称methylenechlormadinone 类别长效避孕药性状白色或微黄色结晶或结晶性粉末，无臭，无味，熔点198~206。难溶于水，易溶于氯仿、丙酮、乙酸乙酯。制剂复方次甲氯地孕酮片：每片含次甲氯地孕酮12mg和炔雌醚3mg。分子式成分药理及应用为口服有效的强效孕激素，与氯地孕酮相比，具有较强的排卵抑制作用。与长效雌激素炔雌醚配伍可作为长效口服避孕药，每服1片，可避孕20~26天。用法用量口服：于月经第5天服1片，20天后服第2片，以后每隔26天服1片。注重事项可有恶心、呕吐、头晕、食欲不振、乏力，白带增多等，少数有闭经或经量增多，但随服药次数增加，症状会减轻或消失。如服用抗副反应片（每片含维生素b630mg、优托品5mg、咖啡因30mg），可减少副作用；加服奋乃静2mg，效果更好，其他见氯地孕酮。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com