

盐酸纳洛酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E7_BA_B3_E6_c22_313910.htm 药品名称盐酸纳洛酮
药物别名苏诺 英文名称Naloxone Hydrochloride 类别有机氟中毒解毒药及其他解毒药制剂注射液：1ml：0.04mg、1ml
：0.4mg。本品为无色的澄明液体 分子式成分17-烯丙基-4，5-环氧基-3，14-二羟基吗啡喃-6酮盐酸盐 药动学口服可吸收，但首过效应大。静注2min内显效，能很快通过血脑屏障。肌注、皮下注射、舌下或气管内给药起效比静注稍迟。T_{1/2}为60min～90min，肝内代谢。本品静注和气管内给药1～3分钟，肌注或皮下注射5～10分钟产生效果，本品吸收迅速，易透过血脑屏障，代谢很快，作用持续45～90分钟，人血浆半衰期为90分钟，口服吸收效果差。适应症麻醉性镇痛药的急性中毒及酒精急性中毒，首选用于已知或疑为阿片类药物过量引起的呼吸抑制和昏迷等，也可用于阿片类药物成瘾者的鉴别诊断。不良反应有血压上升、心率加快、胸闷、震颤、恶心、呕吐等。用法用量皮下、肌肉或静脉注射，阿片类药物过量中毒，成人0.4mg（或10(g/kg)）/次，需要时2～3min可重复1次；阿片类药物所致的术后呼吸抑制，每次按体重1.3(g～3(g/kg。阿片依靠者的鉴别诊断，肌注0.4mg/次，20～30min内无反应可再肌注1次。重度酒精中毒，肌肉或静脉注射0.8mg～1.2mg，1h后重复给药0.4mg～0.8mg。注重事项妊娠B类。对阿片类药物依靠者，可迅速激发严重的戒断症状，应注重病人的用药史。本品无依靠性，心功能障碍和高血压患者慎用。本品鉴别试验阴性者仍不能排除阿片依靠阳性。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细

请访问 www.100test.com