

他莫昔芬〔基〕 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BB\\_96\\_E8\\_8E\\_AB\\_E6\\_98\\_94\\_E8\\_c22\\_313911.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E4_BB_96_E8_8E_AB_E6_98_94_E8_c22_313911.htm) 药品名称他莫昔芬〔基〕 药物别名三苯氧胺，NOLVADEX，TAMOFEN，TAM 英文名称Tamoxifen〔 〕 类别抗肿瘤激素类性状为白色或淡黄色晶末，无臭。熔点96~98。其枸橼酸盐结晶熔点140~142。

。制剂片剂：每片含枸橼酸他莫昔芬15.2mg（相当于他莫昔芬10mg）。分子式成分本品为合成的抗雌激素药物，有抗雌激素的作用，主要用于乳腺癌。药理及应用他莫昔芬是雌激素的部分激动剂，具有雌激素样作用，但强度仅为雌二醇的1/2。动物实验能促使阴道上皮角化和子宫重量增加，并能防止受精卵着床，延迟排卵。它与雌二醇竞争雌激素受体，这种药物受体复合物可转位入细胞核内，阻止染色体基因活化，从而抑制肿瘤细胞生长。口服后迅速被吸收，口服4~7小时后血中浓度达高峰。消除半衰期7天。连续给药7天后血中稳定在高水平。其代谢产物为N-去甲基他莫昔芬和4-羟他莫昔芬。大部分以结合物形成由粪便排出，少量从尿中排出。临床适应证：临床治疗乳腺癌的有效率一般在30%左右，雌激素受体阳性病人疗效较好（49%），阴性病人疗效差（7%）。绝经前和绝经后患者均可使用，而绝经后和60岁以上的人较绝经前和年青病人的效果为好。从病灶部位来看，皮肤、淋巴结和软组织的疗效好，骨和内脏转移的效果差。适用于治疗晚期乳腺癌和卵巢癌。贮存避光密闭保存。用法用量口服，每次10mg，1日2次，可连续使用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

