

硝酸咪康唑霜(栓) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A1\\_9D\\_E9\\_85\\_B8\\_E5\\_92\\_AA\\_E5\\_c22\\_313931.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_A1_9D_E9_85_B8_E5_92_AA_E5_c22_313931.htm) 药品名称硝酸咪康唑霜(栓) 药物别名达克宁霜、可宁 Monistat 英文名称Miconazole Nitrate Cream 类别皮肤科用药制剂栓剂：100、200、400mg/粒；霜剂：15g/2%。分子式成分化学名称为：1-[2-(2,4-二氯苯基)-2-[(2,4-二氯苯基)甲氧基]乙基]-1H-咪唑的硝酸盐。

分子式：C<sub>18</sub>H<sub>14</sub>Cl<sub>4</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>HNO<sub>3</sub>。分子量：479.15。药理毒理咪康唑为人工合成的苯乙基咪唑衍生物，为广谱抗真菌药，对皮真菌、念珠菌、酵母菌及其它藻类、子囊菌、隐球菌等具有抑制和杀灭作用，同时对革兰氏阳性球菌和杆菌也有很强的抗菌力。咪康唑作用于菌体细胞膜，改变其通透性，阻止营养物摄取，导致其死亡。适应症皮肤、五官、阴道等部位的真菌感染等。由酵母菌(如念珠菌等)和革兰氏阳性细菌引起的阴道感染和继发性感染。不良反应偶可引起变态反应如皮疹、局部刺激等等。用法用量栓剂，阴道给药，0.1g/次，1次/日，连用7日。霜剂外用：涂于患处。皮肤感染每日2次，敷药膏于患处，用手指涂擦，使药物全部渗入皮肤。待患处损害全部消失后(通常需2-5周)，应继续用药10天，以防复发。指(趾)甲感染尽量剪尽患甲，每日一次，敷少许药膏于患处，用手指涂匀。患甲松动后(约需2-3周)应继续用药至新甲开始生长。确见疗效一般需7个月左右。念珠菌阴道炎每日就寝前用涂药器将药膏(约5g)挤入阴道深处，必须连续用2周。月经期内也可进行。二次复发后再用，仍然有效。注重事项妊娠B类。孕妇、哺乳妇女及儿童慎用。参见抗感染

药物。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细  
请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)