

卡前列素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_8D_A1_E5_89_8D_E5_88_97_E7_c22_313936.htm 药品名称卡前列素 英文名称Carboprost [] 类别抗早孕药制剂膜剂：每张2mg（相当于（S）体0.75mg）。栓剂：每粒8mg。海绵块：每块6mg。注射用卡前列腺素：每支2mg（1ml）。分子式成分（15-甲基PGF₂，Prostin / 15M）药理及应用为PGF₂ 叫衍生物，比较稳定，作用较持久，肌注或阴道给药均有效，产生子宫收缩作用。从阴道给药后轻易吸收，经1~3小时生效，作用维持8~10小时。临床用于抗早孕、扩宫颈及中期引产。如与丙酸睾酮素或孕三烯酮等合用，可提高抗早孕成功率。用法用量阴道给药，用于抗早孕：（1）先口服孕三烯酮每日9mg（3次分服），共4天，停药48小时后阴道后穹窿放置卡前列素薄膜，每2.5小时1张（2mg），共4次，或放置1粒卡前列素栓剂（8mg），8小时后如无流产，再肌注卡前列素2mg。（2）先肌注丙酸睾酮每日1次100mg，共3天，第4天阴道后穹窿放置卡前列素海绵块1块（6mg），8小时后如无流产，再肌注卡前列素2mg。若无效，2天后重复一疗程。放置卡前列素后需卧床休息2~3小时，收集所有阴道排出物。（3）天花粉过敏试验呈阴性者，肌内注射天花粉试探剂量0.2mg，经2小时如无反应，则肌内注射5mg。2天后开始给予卡前列素阴道薄膜或栓剂，然后再肌注，用法同上。注意事项可有恶心、呕吐、头晕、腹泻等。有哮喘、高血压、肝、肾病者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com