

吉美前列素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E5\\_90\\_89\\_E7\\_BE\\_8E\\_E5\\_89\\_8D\\_E5\\_c22\\_313942.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_90_89_E7_BE_8E_E5_89_8D_E5_c22_313942.htm) 药品名称吉美前列素  
药物别名（ono802，cervagem，preglandin）英文名  
称gemeprost〔 〕类别抗早孕药制剂栓剂：每粒1mg。分子  
式成分药理及应用为pge1衍生物，比较稳定，选择性较高，  
不良反应少。能强烈收缩子宫平滑肌，而对消化道平滑肌、  
血压等影响小。还有软化和扩张子宫颈管的作用，其效力大  
于pgf2。阴道给药后，1小时血浓度达峰值，t<sub>1/2</sub>3小时。临  
床用于抗早孕、扩宫颈及中期引产等。与米非司酮合用，可  
使抗早孕全流率明显提高。相互作用不能与缩宫素、非甾体  
抗炎药合用。用法用量阴道给药（1）用于抗早孕，每3小时1  
次1mg，将吉美前列素栓放入阴道后穹窿处，每日1~5次。如  
与米非司酮合用，先口服米非司酮每日150mg，连服4天，然  
后阴道给予吉美前列素栓1mg，共2次。（2）扩宫颈，于负  
压吸宫或子宫检查前3小时阴道后穹窿处放入1mg吉美前列素  
栓。（3）中期引产、堕死胎或子宫内容物，于阴道后穹窿  
处每次1枚，每3~6小时1次，直至排出（不超过5枚）；如30  
小时后无效；可重复1个疗程。注重事项（1）与手术相比，  
本品失血很少。主要有腹痛、腹泻、恶心、呕吐、潮红、头  
痛和发热等，但并不严重，一般不必处理。（2）应在密切  
监护下使用。不可作为催产药用于临产孕妇。（3）禁用于  
前置胎盘、宫外孕等操作有危险的患者及盆腔感染发热者。  
青光眼、宫颈炎或阴道炎、哮喘、有心血管病史者慎用。过  
敏者、瘢痕子宫患者忌用。100Test 下载频道开通，各类考试  
题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)