

蝮蛇抗毒血清 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E8_9D_AE_E8_9B_87_E6_8A_97_E6_c22_313952.htm 药品名称蝮蛇抗毒血清
药物别名蝮蛇抗毒素 类别蛇药制剂注射液：每支8000单位（10ml）。
药理及应用能中和蝮蛇蛇毒，具有消除症状快、明显降低死亡率的特点，
早期应用效果较好。用法用量抢救时多采用静脉注射，每次6000~12000单位，
用20~40ml生理盐水或25%~50%葡萄糖液稀释后缓慢静注。注重事项（1）
可引起血清过敏反应，如发热、麻疹样皮疹、荨麻疹、胸闷、气短、苍白、
恶心、呕吐、腹痛、抽搐等。（2）为预防血清过敏反应，注射前应作皮试：
取本品0.1ml，加1.9ml生理盐水稀释，在前臂单侧皮内注射0.1ml，
观察15~20分钟，四周无红晕及蜘蛛足者为阴性。但皮试亦有假阴性或假阳性者。
（3）在用本品以前肌注苯海拉明20mg，或将地塞米松5mg加于25%~50%
葡萄糖液20ml内静注，15分钟后再注射本品，一般可防止产生过敏反应。
即使出现反应，亦可较快消失。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com