

复方苯酚糊剂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_A4_8D_E6_96_B9_E8_8B_AF_E9_c22_313954.htm 药品名称复方苯酚糊剂 类别外用避孕药性状黄色糊状物，有苯酚特异臭。制剂糊剂：每瓶32g，可供16~20人使用。分子式成分由苯酚、盐酸阿的平、胆影酸等组成。药理及应用为一种女用非手术绝育药物，将其注入输卵管，可使粘膜破坏，肉芽增生，疤痕形成，造成输卵管堵塞，达到绝育效果。苯酚能消毒杀菌，有腐蚀作用，在用药局部造成化学性炎症，导致输卵管上皮坏死脱落；阿的平能促使上皮下组织增生，形成肉芽组织纤维化，使管腔闭塞；胆影酸用以检查药物定位。本剂一般经约1~2个月完全吸收，并排出体外，输卵管不存在任何异物，不致发生其他病变。为克服阿的平引起的急性期发热现象；减少其含量的新复方苯酚糊剂，效果较好。一般二胎以上没有输卵管炎、盆腔炎、盆腔肿瘤及神经官能症的育龄妇女均可采用此法绝育。用法用量用输卵管注入器将药剂由子宫角注入两侧输卵管，每侧各0.2ml。经摄盆腔平片后，如双侧输卵管内有1.5cm以上长度药物存在，则操作成功。注重事项（1）术后几天阴道可有少量黄色血性分泌物流出，少数有白带增多，有时可有不同程度的下腹胀痛、腰酸、食欲不振等。一般经2周左右，都能好转自愈。少数术后有短暂发热现象（38℃），持续1~3天，对症处理，均可消退。（2）药剂注入成功后，一个月内禁行房事，以免引起上行感染，其后可不必采取任何避孕措施。（3）使用时间以月经干净后的上半周期为宜；产后4个月者即可使用，但长期哺乳、月经未好转者不宜注药。（4）取环者，可在取环时同时注药绝育。

人工流产时不能同时使用，须待下次月经干净后再注药。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com