

维胺酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E7_BB_B4_E8_83_BA_E9_85_AF_c22_313965.htm 药品名称维胺酯药物别名维甲酰胺、维胺脂(酯) 英文名称Viaminati 类别皮肤科用药制剂25MG/20、粒本品为胶囊剂，内容物为黄色颗粒或粉末。

分子式成分分子式：C₂₉H₃₇NO₃。分子量：447.62。药理毒理本品为维A酸衍生物，结构式近似全反式维A酸，作用机制与13-顺维A酸及芳香维A酸较相似，但副作用较全反式维A酸轻。口服具有调节和控制上皮细胞分化与生长，抑制角化，减少皮脂分泌，抑制角质形成细胞的角化过程，使角化异常恢复正常，抑制痤疮丙酸菌的生长，并有调节免疫及抗炎作用。药动学本品口服后大部分经肠道吸收，经肝、胆代谢后由尿、便排出。健康男性空腹单次口服本品10mg，达峰时间为 2.612 ± 0.778 小时，血药峰浓度为 $17.496 \pm 8.992 \mu\text{g/ml}$ ，半衰期($t_{1/2}$)为 2.378 ± 0.871 小时。适应症各种痤疮、角化异常性皮肤病，对鱼鳞病、银屑病（牛皮癣）、苔癣类皮肤病、粘膜病及结缔组织疾病等也有一定疗效。不良反应1．本药的副作用与维生素A过量的临床表现相似，常见的副作用包括皮肤干燥、脱屑、瘙痒、皮疹、脆性增加、掌跖脱皮、瘀斑、继发感染等；口腔粘膜干燥、疼痛、结合膜炎、严重者角膜混浊、视力障碍、视乳头水肿，头痛、头晕、精神症状、抑郁、良性脑压增高。2．骨质疏松、肌肉无力、疼痛、胃肠道症状、鼻衄等；3．妊娠服药可导致自发性流产及胎儿发育畸形；4．实验室检查可引起血沉快、肝酶升高、血脂升高、血糖升高、血小板下降等。5．上述副作用与异维A酸引起的副作用相似，但相对较轻，且大多为可逆性，停药后

可逐渐得到恢复。副作用的轻重与本药的剂量大小、疗程长短及个体耐受有关。6. 轻度不良反应可不必停药，或减量使用，重度不良反应应立即停药，并去医院由医师作相应处理。相互作用1. 于异维A酸与四环素类抗生素合用时，可导致假性脑瘤引起脑压增高，头痛和视力障碍；2. 与维生素A合用时，可产生维生素A过量的相似症状；3. 与胺甲蝶喋合用时可使胺甲蝶喋的血药浓度增加而加重肝脏的毒性，维胺脂与异维A酸结构近似，亦应避免与上述药物同时使用。用法用量口服按1-2.0mg/kg/天计算，成人每次1-2粒

(25mg-50mg)，每日服三次。疗程治疗痤疮为6周，脂溢性皮炎为4周。或遵医嘱。注重事项孕妇及哺乳期妇女禁用，小儿慎用。女性患者服药期间及停药后半年内应采取严格避孕措施，肝肾功能严重不全者慎用。1. 女性患者服药期间及停药后半年内应采取严格避孕措施；2. 肝肾功能严重不全者慎用；3. 重症糖尿病、脂质代谢障碍者禁用；4. 禁与维生素A同服；5. 酗酒者慎用；6. 避免强烈日光或紫外光过度照射。#093.孕妇及哺乳期妇女禁用。#093.对儿童的安全性尚不清楚，过量服药可产生骨骼改变，如儿童骨骺盘的早熟融合。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com