

依替膦酸钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BE\\_9D\\_E6\\_9B\\_BF\\_E8\\_86\\_A6\\_E9\\_c22\\_313977.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E4_BE_9D_E6_9B_BF_E8_86_A6_E9_c22_313977.htm) 药品名称依替膦酸钠  
药物别名羟乙膦酸钠，依膦、邦特林 英文名称Etidronate  
Disodium 类别甲状旁腺及降钙代谢药制剂片剂：0.2g。分子  
式成分化学名：双膦酸氢二钠。药理毒理本品为骨吸收抑制  
剂。在低剂量时，通过抑制破骨细胞活性，防止骨的吸收、  
降低骨转换率而达到骨钙调节作用。药动学正常成人一次口  
服20mg/kg，1小时后血清中浓度达到最高、半衰期为2小时  
，24小时后为0.03ug/ml，连续服药7天未见积蓄倾向。本品吸  
收率约6%，进入体内后在骨及肾脏中浓度最高，从尿中排  
出8-16%，从粪便中排出82-94%。适应症骨质疏松症、异位  
骨化，如佩吉特（Paget）病、变形性骨炎、肾结石、恶性高  
钙血症等。不良反应可出现腹部不适、腹泻、软便、口炎、  
头痛、皮疹等。用法用量口服，0.2g/次，2次/日，两餐间服  
用。注重事项需间隙、周期服药，服药2周后停药11周，停药  
期间需补钙剂及维生素D3。肾功能损害者、孕妇及哺乳期妇  
女慎用。服药2小时内，避免食用高钙食品（例如牛奶或奶  
制品）以及含矿物质的维生素或抗酸药。肾功能损害者、孕  
妇及哺乳期妇女慎用。若出现皮肤搔痒、皮疹等过敏症状时  
应停止用药 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。  
详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)