

鲑降钙素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E9_B2_91_E9_99_8D_E9_92_99_E7_c22_313989.htm 药品名称鲑降钙素 英文名称Salcatonin 类别甲状旁腺及降钙代谢药制剂50IU/1ML。遮光，2-8℃保存。分子式成分鲑鱼的多肽合成物质药理毒理抑制破骨细胞的活性；抑制骨盐溶解，阻止骨内钙释出；改善骨密度，有效缓解疼痛症状；降低骨折的危险性；降低血钙。药动学肌肉和皮下注射后，一小时达到最大血药浓度，半衰期70-90分钟，绝对生物利用度在约70%。本品及代谢产物的95%经肾脏排泄，2%以原形排泄，表观分布容积0.15-0.31/kg，蛋白结合型占30-40%。适应症绝经的骨质疏松症、增龄性骨质疏松症；继发于乳腺癌、肺癌或肾癌、骨髓瘤和其他恶性肿瘤骨转移所致高钙血症；变形性骨炎。不良反应与剂量有关，偶有恶心、呕吐、头晕、轻度面部潮红伴发热感，个别有过敏反应、心悸。用法用量皮下或肌肉注射，每日一次，每次50~100IU或隔日100IU，并根据个体需要适量摄入钙和维生素D，以防骨质进行性丢失。治疗高钙血症：每日每公斤体重5~10IU，一次或分两次皮下或肌肉注射。治疗变形性骨炎：皮下或肌肉注射，每日或隔日100IU。注重事项降钙素过敏者，孕妇及哺乳期妇女禁用。1、临床使用前，必须进行皮肤试验：用t.b针筒取0.2ml，用生理盐不稀释至1ml，皮下注射0.1ml（约1单位），观察15分钟，应不超过中度红色为阴性。2、长期卧床治疗的患者，每月需检查血液生化和肾功能。3、尚无儿童使用经验。4、变形性骨炎及有骨折史的慢性疾病患者，根据血清碱性磷酸酶及尿羟脯氨酸排出量决定停药或继续治疗。100Test 下载频道开通，

各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com