

壬苯醇醚 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/313/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A3\\_AC\\_E8\\_8B\\_AF\\_E9\\_86\\_87\\_E9\\_c22\\_313991.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_A3_AC_E8_8B_AF_E9_86_87_E9_c22_313991.htm) 药品名称壬苯醇醚 英文名称nonoxinol 类别外用避孕药性状几无色液体，低温固化，粘度（25℃）175～250厘泊。溶于水、乙醇、二氯乙烷、二甲苯、玉米油。制剂膜剂：每张50mg。海绵剂（直径5.5cm×厚2.5cm）：每块1g。栓剂：每粒75mg，100mg。分子式成分药理及应用为非离子型表面活性剂，是目前使用最普遍的一种外用杀精子药。主要作用是通过降低精子脂膜表面张力、改变精子渗透压而杀死精子或导致精子不能游动，从而使精子不能进入宫颈口，无法使卵受精，达到避孕的目的。本品避孕薄膜放入阴道深处后溶解成凝胶体（约5分钟），作用保持2小时。栓剂经10分钟生效，作用维持2～10小时。含药海绵放置后即可生效，作用维持至少24小时；它作为一种子宫颈口的机械性屏障，当精液与海绵接触即被吸收，同时海绵释放杀精剂，故避孕效果较好。用法用量（1）薄膜：女用时，于房事前3～5分钟，将药膜1张揉成松软小团推入阴道深处，使之溶解成凝胶体。每次性交须用新的药膜。男用时，将药膜1张折成双折，贴在阴茎头上，推入女方阴道深处，约5分钟后进行房事。（2）海绵剂：使用时用清洁水浸湿，挤去过量水，深置阴道中，房事后留放6小时，但不超过30小时，也不能重复使用。（3）栓剂：房事前1小时放入阴道中，1次75mg或100mg。注重事项主要有阴道刺激局部反应，产生阴道分泌物增多及烧灼感。房事后6～8小时内不要冲洗阴道。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)