

双唑泰泡腾片 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/313/2021_2022__E5_8F_8C_E5_94_91_E6_B3_B0_E6_c22_313999.htm 药品名称双唑泰泡腾片 英文名称Metronidazole，Clotrimazole and chlorhexidin 类别皮肤科用药制剂本品为白色或类白色片，表面有稍微的隐斑。泡腾片：0.8g/片（复方）分子式成分甲硝唑、克霉唑、醋酸洗必泰、泡腾剂等。药理毒理本品由抑杀厌氧菌、滴虫、阿米巴原虫的甲硝唑。抑杀真菌的克霉唑和抑杀需氧菌的醋酸洗必泰三种药物与辅助料配方研制而成。经抑菌试验证实，本品药物的各种组份间在药效上既保持各单味药的抑杀细菌、霉菌、滴虫的生物活性又有治疗学上的协同作用。非凡对混合性感染疗效更显著。适应症厌氧菌、滴虫、霉菌、淋球菌、革兰氏阴阳细菌之单纯或混合性感染所引起的妇科、肛肠科、皮肤科常见病，如盆腔炎，宫颈糜烂、阴道炎、带下阴氧、某些性病；内外痔、肛裂、肛瘘、直肠炎、直肠脓肿；皮肤感染、体癣、手足癣、青年痤疮、洒精鼻、疥疮等。不良反应极个别患者有阴道灼热感，停药后可恢复。用法用量妇科：每晚临睡前洗交阴部后用戴指套的食指将1-2片药置于阴道后穹窿处，七日为一疗程，停药后第二次月经后重复一个疗程或遵医嘱。肛肠科：肛门给药，每日早晚各一次，，每次1-2片。十日为一疗程，或遵医嘱（应在排便后使用）。皮肤外用：取本品一片或数片研成细粉直接外撒患处或用少许将其细粉调成混悬液，外擦患处，每日3-5次。手足癣：用温水洗泡手、足30分钟后，除净脱落的角质和死皮，擦其细粉，或用200ml温水溶解药物3至数片，浸泡手足30分钟以上，每日至少两次。注重事项孕妇禁用。本品属非凡工

艺生产品种，在贮存过程部分会产生约1-2ml左右的惰性气体。使双铝包装鼓包，但不影响内在质量与疗效。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com