

派瑞松乳膏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E6_B4_BE_E7_91_9E_E6_9D_BE_E4_c22_314019.htm 药品名称派瑞松乳膏
英文名称派瑞松乳膏 Pevisone 类别皮肤科用药制剂乳膏：15g/支。分子式成分曲安奈德 triamcinolone acetonide 0.1%，硝酸益康唑 econazole nitrate 1%。本品是在水包油乳剂的基础上制成，为0.1%曲安奈德和1%硝酸益康唑的复合物，除此之外尚含有下列成分：苯甲酸、羟丁基酸，赋形剂和净化剂。药理毒理硝酸益康唑是一种广谱抗真菌药，有抗表皮癣菌、酵母菌和霉样菌的活性，而且对革兰氏阳性细菌也有效(如金黄色葡萄球菌)。曲安奈德显著地提高了其抗炎、止痒及抗过敏的作用。适应症湿疹，由真菌及/或细菌感染所致的炎性皮肤病，如由表皮癣菌、酵母菌和霉样菌所致的炎症性皮真菌病，身体皱褶处的真菌感染及继发性细菌或/及混合感染。也非凡适用于潮湿、渗出、急性/亚急性皮肤病，如甲沟炎，念珠菌性口角炎，尿布性皮炎，浅表脓皮病。不良反应偶见过敏反应。长期使用可造成局部皮肤萎缩，毛细血管扩张及出现皮肤紫纹。用法用量天天早、晚2次将本品涂于患处，疗程应限制于3-4周内。治疗湿疹时，通常2-4周即可痊愈。治疗炎症性真菌病应持续至炎症反应消退，假如需要，疗程应持续至获得完全治愈的效果。注重事项皮肤结核、梅毒或病毒感染(如疱疹、牛痘、水痘)。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com