

氢化可的松软膏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E6_B0_A2_E5_8C_96_E5_8F_AF_E7_c22_314043.htm 药品名称氢化可的松

软膏 药物别名皮质醇 Cortisol 英文名称Hydrocortisone 类别皮肤科用药制剂软膏剂为乳剂型基质的白色软膏。：1%；霜剂

：1%。分子式成分 化学名为：11 β ，17 β ，21-三羟基孕甾-4-烯-3，20-二酮-21-醋酸酯。分子式：C₂₄H₃₂O₆。分子量

：404.50 药理毒理本品为肾上腺皮质激素类药物。外用具有

：(1)抗炎、抗过敏、抗增生、止痒及减少渗出作用；(2)可以减轻和防止组织对炎症的反应，能消除局部非感染性炎症引起的发热、发红及肿胀，从而减轻炎症的表现；(3)免疫抑制作用：防止或抑制细胞中介的免疫反应，延迟性的过敏反应，并减轻原发免疫反应的扩展。药动学本品可经皮肤吸收，尤其在皮肤破损处吸收更快。本品主要经肝脏代谢，转化为四氢可的松和四氢氢化可的松，大多数代谢产物结合成葡萄糖醛酸酯，极少量以原型经尿排泄。适应症过敏性皮炎、脂溢性皮炎、湿疹及皮肤僵痒症等皮肤病。不良反应长期大量使用可继发细菌、真菌感染，局部可发生痤疮、酒渣样皮炎、皮肤萎缩及毛细血管扩张。用法用量外用涂于患处，2次/日。注重事项细菌性、真菌性及病毒性皮肤病忌用。禁用于感染性皮肤病，如脓疱病、体癣、股癣等。对本品过敏者禁用。1.不宜长期使用，并避免全身大面积使用。2.用药一周后症状未缓解，应向医师咨询。3.涂布部位如有灼烧感、瘙痒、红肿等，应停止用药，洗净。必要时向医师咨询。4.当药品性状发生改变时，禁止使用。#093.孕妇需慎用。#093.儿

童需慎用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com