

曲安奈德软膏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E6\\_9B\\_B2\\_E5\\_AE\\_89\\_E5\\_A5\\_88\\_E5\\_c22\\_314049.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E6_9B_B2_E5_AE_89_E5_A5_88_E5_c22_314049.htm) 药品名称曲安奈德软膏  
药物别名曲安缩松，去炎舒松 英文名称triamcinolone  
Acetonide 类别皮肤科用药制剂软膏剂和乳膏剂：0.025%、0.2%、0.5%。本品为乳剂型基质的白色软膏 分子式成分化学名为：16 $\beta$ ，17-[(甲基亚乙基)双(氧)]-11 $\beta$ ，21-二羟基-9-氟孕甾-1，4-二烯-3，20-二酮-21-醋酸酯。分子式：C<sub>24</sub>H<sub>33</sub>FO<sub>7</sub>。分子量：476.54 药理毒理本品为糖皮质激素类药物。外用具有抗炎、抗过敏及止痒作用，能消除局部非感染性炎症引起的发热、发红及肿胀。适应症神经性皮炎、湿疹、银屑病、扁平苔癣及类风湿性关节炎等。不良反应长期大量使用可继发细菌、真菌感染，局部可发生痤疮、酒渣样皮炎、皮肤萎缩及毛细血管扩张。用法用量外用：涂于患处，2次/日；肌注：每周1次，20mg~80mg/次；皮下或关节腔内注射：一般2.5mg~5mg或酌情用量。皮损处注射，每处0.2mg~0.3mg，日剂量不超过30mg，每周不超过75mg。注重事项细菌性、真菌性及病毒性皮肤病忌用。禁用于感染性皮肤病如脓疱病、体癣、股癣等。对本品过敏者禁用。不宜长期使用，并避免全身大面积使用。用药1周后症状未缓解，应向医师咨询。涂布部位如有灼烧感、瘙痒、红肿等，应停止用药，洗净。必要时向医师咨询。当药品性状发生改变时禁止使用。请将此药品放在儿童不能接触的地方。#093. 孕妇及哺乳期妇女在权衡利弊情况下，尽可能避免长期、大量使用。#093. 小儿如长期使用肾上腺皮质激素，须十分慎重。#093. 避免长期、大量使用。 100Test 下载频道开通，各类考试

题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)