

低精蛋白胰岛素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E4_BD_8E_E7_B2_BE_E8_9B_8B_E7_c22_314054.htm 药品名称低精蛋白胰

岛素药物别名（低精蛋白锌胰岛素，中性精蛋白锌胰岛素，中效胰岛素，Insulin NPH，NPH-Iletin）英文名称Isophane Insulin〔 〕类别胰岛激素及其他影响血糖的药物性状由胰岛素和适量的硫酸鱼精蛋白、氯化锌相结合而制成的中性灭菌白色混悬液，无凝块。pH为7.1～7.4。每100单位胰岛素的混悬液内含硫酸精蛋白0.3～0.6mg，含锌量折合氯化锌不超过0.04mg。制剂注射液：每支400单位（10m）；800单位（10ml）。药理及应用药理作用与胰岛素同。皮下注射后2～4小时开始作用，8～12小时达高峰，持续时间达18～24小时，介于胰岛素和精蛋白锌胰岛素之间，较少发生夜间低血糖反应，低血糖反应多发生在午后，须注重。用于一般中、轻度糖尿病。治疗重度糖尿病须与正规胰岛素合用，使作用出现快而维持时间长。也可与长效类胰岛素制剂合用以延长作用时间。对于血糖波动较大，不易控制的患者适合选用本品。用法用量皮下注射，每日早餐前半小时注射1次，一般由小剂量开始，用量视病情而定。如每日用量超过40单位者，应分2次注射

注重事项皮下注射，每日早餐前半小时注射1次，一般由小剂量开始，用量视病情而定。如每日用量超过40单位者，应分2次注射

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com