

联苯苄唑乳膏剂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E8_81_94_E8_8B_AF_E8_8B_84_E5_c22_314072.htm 药品名称联苯苄唑乳膏剂 药物别名美克、孚琪乳膏、美克、霉克 Mycospor 英文名称Bifonazole Cream 类别皮肤科用药制剂10g/支 分子式成分联苯苄唑的化学名为1-[(4-二苯基)-苯基-甲基]-1H-咪唑。分子式为C₂₂H₁₈N₂，分子量为310.4。外观呈白色、晶状粉末，熔点：147-151 °C。不溶于水，在二氯甲烷和甲醇中能很好溶解，在丙酮、二甲亚砜和N,N-二甲基酰胺中能自由地溶解，对热稳定，不易氧化及吸潮，在酸性和中度碱性环境下稳定。本药不含油脂，没有气味，其基质轻易洗掉，不会污染衣物。 药理毒理本药为咪唑类抗真菌剂，具有广谱抗真菌作用，对皮肤真菌、酵母菌、霉菌及其它真菌，如秕糠状鳞斑霉菌，微小棒状杆菌有效。体外试验表明本药对皮肤真菌(如发癣菌)的作用主要是杀菌，而对酵母菌的作用主要是抑菌。本药能很好地透过被感染的皮肤，作用迅速并持续时间长，维持时间超过48 hr。 药动学本药为咪唑类抗真菌剂，具有广谱抗真菌作用，对皮肤真菌、酵母菌、霉菌及其它真菌，如秕糠状鳞斑霉菌，微小棒状杆菌有效。体外试验表明本药对皮肤真菌(如发癣菌)的作用主要是杀菌，而对酵母菌的作用主要是抑菌。本药能很好地透过被感染的皮肤，作用迅速并持续时间长，维持时间超过48 hr。适应症急性及慢性皮肤真菌病，非凡是皮肤毛癣菌属，小孢子菌属，絮状表皮癣菌；酵母菌，如白色念珠菌及其它种类的酵母菌；霉菌，如曲霉菌所致的皮肤真菌病；秕糠状鳞斑霉所引起的花斑糠疹；棒状

杆菌所致的红癣；上述真菌所致皮肤浅表感染。不良反应少见局部皮肤反应，例如稍微发红、烧灼感、刺痒及鳞屑。相互作用如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。用法用量在被感染的皮肤表面薄薄地涂抹一层，并按摩局部皮肤使药物渗入皮内，每日使用1次，最好在就寝之前涂用。疗程：运动员脚趾间癣：3周；体癣、股癣、手癣：2-3周；浅表念珠菌病：2-4周；花斑糠疹、红癣：2周。注重事项1、对联苯苄唑过敏者及已知对鲸蜡硬脂醇过敏者。2、避免接触眼睛，并切忌口服。3、用药部位如有灼烧感、瘙痒、红肿等应停止用药，洗净。必要时向医师咨询。4、当药品性状发生改变时禁止使用。5、儿童必须在成人监护下使用。6、请将此药品放在儿童不能接触的地方。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com