

环吡酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E7\\_8E\\_AF\\_E5\\_90\\_A1\\_E9\\_85\\_AE\\_c22\\_314109.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E7_8E_AF_E5_90_A1_E9_85_AE_c22_314109.htm) 药品名称环吡酮药物别名巴特芬 Batrafen 英文名称ciclopirox 类别皮肤科用药制剂溶液剂：2.5g 分子式成分每克巴特芬指(趾)甲涂剂含8%环吡酮80 mg及甲基乙烯醚、马来酸单丁酯、乙酸乙酯和2-丙醇的共聚物。药理毒理本药对引起甲真菌感染的所有有关病原真菌都有杀灭作用。药动学涂药后48小时内，其有效成分环吡酮渗透入甲板开始发挥杀真菌作用。适应症指(趾)甲真菌感染(灰指甲)。不良反应当本药与指(趾)甲四周的皮肤接触时，极少数病人可能有皮肤发红和产生鳞屑的现象。用法用量在第一次使用本药之前，应先尽可能地将被感染的指(趾)甲剪去，并用所提供的指(趾)甲砂锉使病甲变得粗糙。在治疗的第1个月内，每隔1日在病甲部分涂一薄层巴特芬；第2个月内，用量可减至每星期至少涂药2次；从治疗的第3个月开始，每星期涂药1次。在整个疗程中，应每星期1次用指(趾)甲清洗剂洗去整层薄膜，同时尽可能地将病甲用砂锉再次除去，若涂剂薄膜层被破坏，应及时重新涂药覆盖该部分。疗程的长短取决于感染的严重程度，但不应超过6个月。为避免涂剂变干，使用后应立即旋紧瓶盖并应避免将涂剂溅在瓶盖螺旋口上。注重事项怀孕和哺乳妇女慎用。儿童不宜使用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)