

红霉素软膏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E7_BA_A2_E9_9C_89_E7_B4_A0_E8_c22_314199.htm 药品名称红霉素软膏
英文名称Erythromycin Ointment 类别皮肤科用药制剂本品为
白色或淡黄色或黄色软膏。1% 分子式成分分子式

: C₃₇H₆₇NO₁₃。分子量：733.94 药理毒理红霉素属大环内酯类抗生素，对葡萄球菌属、各组链球菌和革兰阳性杆菌均具抗菌活性。奈瑟菌属、流感嗜血杆菌、百日咳鲍特氏菌等也可对本品敏感。本品对除脆弱拟杆菌和梭杆菌属以外的各种厌氧菌亦具抗菌活性；对军团菌属、胎儿弯曲菌、某些螺旋体、肺炎支原体、立克次体属和衣原体属也有抑制作用。本品系抑菌剂，但在高浓度时对某些细菌也具杀菌作用。本品可透过细菌细胞膜，在接近供位（P位）处与细菌核糖体的50S亚基成可逆性结合，阻断了转移核糖核酸（t-RNA）结合至P位上，同时也阻断了多肽链自受位（A位）至P位的位移，因而细菌蛋白质合成受抑制。红霉素仅对分裂活跃的细菌有效。药动学本品局部用药后很少吸收入血。适应症平常痤疮。不良反应最常见的不良反应是局部烧灼感，也可有干燥、发痒、红斑，偶见荨麻疹样反应。用法用量涂于患处，一日2次。注重事项对红霉素过敏者禁用。请勿接触眼、鼻、口。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com