

格列喹酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E6\\_A0\\_BC\\_E5\\_88\\_97\\_E5\\_96\\_B9\\_E9\\_c22\\_314208.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E6_A0_BC_E5_88_97_E5_96_B9_E9_c22_314208.htm) 药品名称格列喹酮药物别名（糖肾平，Glurenorm）英文名称Gliquidone 类别胰岛素及其他影响血糖的药物制剂片剂：30mg。药动学口服吸收快，T<sub>max</sub>约2~3h，作用持续8h，T<sub>1/2</sub>为1~2h。95%经肝代谢，5%经肾排出。适应症单凭饮食控制疗效不满足的轻、中度非胰岛素依靠型糖尿病，但病人胰岛B细胞须有一定的分泌胰岛素的功能且无严重的并发症。用法用量口服，开始30mg/次，早餐前1次或早餐及午餐前各1次，也可15mg/次，三餐前各1次，必要时1周后递增30mg/日。一般量90mg~120mg/日，最大量180mg/日。注重事项在磺酰脲类药物中，本品引起严重持久的低血糖危险性最小。糖尿病并发轻至中度肾功能不全者用本品比其他磺酰脲类药物优越。妊娠D类。急性卟啉症病人、孕妇及乳母不宜用。胰岛素依靠型糖尿病、非胰岛素依靠型糖尿病伴酮症酸中毒、昏迷、感染等应激情况及肝、肾功能不全者等禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)