

氨丁三醇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E6_B0_A8_E4_B8_81_E4_B8_89_E9_c22_314213.htm 药品名称氨丁三醇药物别名三羟甲基氨基甲烷，缓血酸铵 类别酸碱平衡调节药性状白色结晶性固体或粉末，易溶于水（1：1.25）。其0.3M水溶液的pH为10.2（室温）。制剂注射液：每支7.28%（10ml）；7.28%（20ml）；7.28%（100ml）。分子式成分药理及应用本品为一氨基缓冲剂，能摄取氢离子而纠正酸血症，其作用较强，且能透过细胞膜。常用于急性代谢性及呼吸性酸血症。用法用量静滴：对急症每次用7.28%溶液2～3mg/kg，于1～2小时内滴完，严重者可再用1次。注重事项（1）本品可引起低血糖、低血压、恶心、呕吐，亦可抑制呼吸甚至使呼吸停止。（2）慢性呼吸性酸血症及肾性酸血症患者忌用。（3）一般用3.64%溶液滴注，可将7.28%溶液（即0.6M溶液）于临用前加等量5%～10%葡萄糖液稀释后用，限制水分病人可直接静滴7.28%溶液。（4）注射时勿溢出静脉外，以免局部坏死。（5）可使肺泡通气量显著减少，故用于呼吸性酸中毒时，必须同时给氧。（6）注射后常可在30～40分钟内纠正酸度，亦有到4～6小时方见好转者。（7）应注重避免剂量过大，滴速过快。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com